



Kutsu



BEYONTTRA[®]
(akoramidiisi) 356 mg tabletti

Hyvä lääkäri

Tervetuloa Bayerin koulutustilaisuuteen

Aika Keskiyöllä 4.11.2026 klo 12.00-13.00
Paikka GOTO35-tila, 3. krs, Logomo, Junakatu 9, Turku

OHJELMA

- 12.00** Lounas tarjolla lounasluentotilassa
- 12.15** ATTR-kardiomyopia vastaanotolla – milloin epäillä ja kenet lähettää eteenpäin?
Marlene Mustonen, kardiologian el, Sydänsairaala Hämeenlinna
- 12.50** Keskustelu ja kysymykset
- 13.00** Tilaisuus päättyy



Ilmoittaudu 28.10. mennessä: <https://events.bayer.com/rxZ5AZ>
Noudathan lounaslippusi Bayerin ständiltä (numero 60) Turun lääketiedepäiviltä!

Lämpimästi tervetuloa!
Ystävällisin terveisin
Bayer Oy, CardioRenal -tiimi

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan, www.fimea.fi

BEYONTTRA 356 mg kalvopäällysteiset tabletit

(Tutustu koko valmisteyhteenvedoon ennen lääkkeen määräämistä.)

Koostumus: *Vaikuttava aine:* Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää akoramidiisihydrokloridia määrän, joka vastaa 356 mg akoramidiisia. *Apuaineet:* Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa (E 460), kroskarmelloosinatrium (E 468), kolloidinen hydratoitu piidioksidi (E 551), magnesiumstearaatti (E 470b), Kalvopäällyste:

makrogolipolyvinyylialkoholi-oksaskopolymeeri (E 1209), talkki (E 553b), titaanidioksidi (E 171), glyserolimonokaprylokapraatti, (tyyppi I) (E 471), polyvinyylialkoholi (E 1203),

Painomuste: musta rautaoksidi (E 172) propyleeniglykoli (E 1520) hypromelloosi 2910 (E 464). **Käyttöaihe:** BEYONTTRA on tarkoitettu villityypin tai variantin transtyretiinivälitteisen amyloidoosin hoitoon aikuispotilaille, joilla on kardiomyopatia (ATTR-CM). **Vasta-aiheet:** Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. **Annostus ja antotapa:** Hoidon voi aloittaa lääkäri, joka on perehtynyt transtyretiinivälitteistä amyloidista kardiomyopatiaa (ATTR-CM) sairastavien potilaiden hoitoon. Akoramidiisin suositeltu annos on 712 mg (kaksi 356 mg:n tablettia) suun kautta kahdesti vuorokaudessa, mikä vastaa 1 424 mg:n

kokonaisvuorokausiannosta. Tabletit niellään kokonaisina. BEYONTTRA voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa. **Varoitukset ja varotoimet:** Akoramidiisia ei ole tutkittu maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, joten sen käyttöä ei suositella tälle potilasryhmälle.

Tietoja vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min) sairastavista potilaista on saatavilla rajallisesti, eikä tietoja dialyysipotilaista ole, minkä vuoksi akoramidiisia on käytettävä varoen tälle potilasryhmälle. Akoramidiisihoitoa saaneilla potilailla esiintyi aluksi arvioidun glomerulusten suodatusnopeuden (eGFR) laskua hoidon ensimmäisen kuukauden aikana ja vastaavasti seerumin mitatun kreatiniiniarvon nousua. Tämä eGFR-arvon ja seerumin kreatiniiniarvon muutos ei ollut etenevä ja korjaantui potilailla, joiden hoito keskeytettiin. Siihen ei liittynyt munuaisvauriota, mikä on yhdenmukaista hemodynaamisen munuaisvaikutuksen kanssa. Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton". **Haittavaikutukset:**

Hyvin yleinen: Ripuli, kihti. **Pakkaukset ja hinnat (vh+alv): 356 mg: 120 tabl. 9828,10 €.**

Toimitusluokitus: Reseptilääke. **Korvattavuus:** Rajoitetusti peruskorvattava (40 %):

Transtyretiinivälitteistä amyloidoosia sairastaville aikuisille, joilla on oirekuvaltaan NYHA I-II -luokan kardiomyopatia, erikoissairaanhoidon kardiologian, neurologian tai sisätautien yksiköstä kirjoitetulla B-lausunnolla (3011). Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi. Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos kardiomyopatia on oirekuvaltaan NYHA I-III -luokassa.

Myyntiluvan haltija: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Saksa. **Lisätietoja saatavissa:** Bayer Oy, p. 020 785 21 **Valmisteyhteenvedon päiväys:** 11/2025, lyhennelmä: 1.1.2026